

PRUEBA DE PERMEABILIDAD CON CÁPSULA INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

iSiga estas instrucciones con atención!

La cápsula para evaluar la permeabilidad es una pastilla digerible que se disuelve para verificar que las cosas se muevan de manera normal a través del tracto gastrointestinal (es decir, que es “permeable” o que se encuentra abierto). Generalmente se usa para determinar si es seguro proceder con una endoscopia por cápsula (un procedimiento en el que se examina su intestino delgado en busca de afecciones como sangrado gastrointestinal crónico, anemia, pólipos del intestino delgado y sospecha de enfermedad de Crohn). Se lleva a cabo una radiografía 24 horas luego de que ingiere la cápsula para asegurar que se haya movido a través de todo el intestino delgado.

PREPARACIÓN PARA SU PROCEDIMIENTO

- **Siga tomando todos** los medicamentos con aspirina y antiinflamatorios, incluyendo ibuprofeno, Motrin, Aleve, naproxeno, Naprosyn, sulindaco, piroxicam, Feldene, indometacina, diclofenaco y Voltaren. También es seguro seguir tomando Tylenol (paracetamol).
- Si es diabético y usa insulina, póngase en contacto con nuestro consultorio para recibir instrucciones específicas.
- LLAME AL CONSULTORIO si tiene cualquier duda sobre los medicamentos que debe tomar o suspender.

**LLAME DE LUNES A VIERNES, DE 7:00 A. M. A 5:00 P. M.
O A NUESTRO NÚMERO FUERA DEL HORARIO DE OFICINA**

**Boise Endoscopy Center (208) 342-7169
Fuera del Horario de Oficina (208) 343-6458**

UN DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- Puede desayunar y almorzar de manera normal antes de las 12 p. m. (al mediodía), seguidos de una dieta a base de líquidos claros durante el resto del día. Evite consumir líquidos de color rojo. Algunos ejemplos de líquidos claros son el jugo de manzana, refresco, café, té, caldo de pollo o res, gelatina, Gatorade o agua natural.
- **NO ingiera absolutamente nada después de las 11:59 p. m.; este punto es muy importante.**
- Puede tomar sus medicamentos recetados de costumbre con pequeños sorbos de agua.

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

- No ingiera alimentos ni bebidas antes de su cita.
- Haga el registro en Boise Endoscopy Center a las 7:15 a. m. el día de su cita.
- Después de hacer el registro se reunirá con una enfermera que repasará las instrucciones con usted, obtendrá su consentimiento y le entregará la pequeña cápsula de permeabilidad para que usted la degluta.
- Luego de que degluta la cápsula de permeabilidad podrá abandonar el centro y volver a sus actividades normales.
- Puede empezar a beber líquidos dos horas después de deglutir la cápsula, y podrá comer cuatro horas después de haberla ingerido.
- Su médico solicitará una radiografía de su abdomen que deberá llevarse a cabo 24 horas luego de que haya deglutido la cápsula de permeabilidad.
- Una enfermera se pondrá en contacto con usted en relación con los resultados de la radiografía abdominal una vez que su médico los haya revisado.

Hora de la cita para la colocación de la cápsula: 7:15 a. m. en _____

Fecha/Hora/Ubicación para la radiografía abdominal: Fecha: _____ Hora: _____ Ubicación: _____

Ubicación de la cita para la colocación de la cápsula: Haga el registro en Boise Endoscopy Center – 425 West Bannock Street, Boise, ID, 83702

Traiga todas sus tarjetas del seguro y una identificación con fotografía. Verifique con su compañía de seguros lo relacionado a la autorización previa. Se requiere el pago por los servicios al momento del registro. Le pedimos que esté listo para hacer el pago.